

oscilloccinum

GLÓBULOS
MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para Usted.

Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe usted utilizar con cuidado OSCILLOCOCCINUM para obtener los mejores resultados.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten durante más de tres días, debe consultar a un médico.

En este prospecto:

- 1- ¿Qué es OSCILLOCOCCINUM y para qué se utiliza?
- 2- Antes de tomar OSCILLOCOCCINUM
- 3- ¿Cómo tomar OSCILLOCOCCINUM?
- 4- Posibles efectos adversos
- 5- Conservación de OSCILLOCOCCINUM

La sustancia activa en cada envase unidosis de 1 gramo de glóbulos es:

Anas barbariae 200 K 0,01 ml
Los demás componentes por cada envase unidosis de 1 gramo son sacarosa (0,85 gramos) y lactosa (0,15 gramos).

Titular de la autorización de comercialización:

Laboratorios BOIRON S.I.H. - Avda. Valdelaparra, 27 - 28108 Alcobendas, MADRID

Fabricante: BOIRON - 2 avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 Messimy, FRANCIA

1. ¿QUÉ ES OSCILLOCOCCINUM Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

Medicamento homeopático utilizado tradicionalmente tanto en el tratamiento sintomático de los estados gripales como durante el periodo de exposición gripal. OSCILLOCOCCINUM se presenta en envase unidosis de 1 gramo de glóbulos en caja de 6 o de 30 unidosis.

2. ANTES DE TOMAR OSCILLOCOCCINUM

Si usted está embarazada o en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

Este medicamento contiene sacarosa y lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

"Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento - incluso los adquiridos sin receta médica".

3. ¿CÓMO TOMAR OSCILLOCOCCINUM?


Para extraer el envase unidosis:



1- Coger una barqueta de 3 envases unidosis.



2- Empujar un envase unidosis desde el lado transparente hasta romper el precinto.



3- Sacar el envase unidosis.

El contenido completo de un envase unidosis corresponde a una toma.

La posología varía según el momento en el que se interviene:

- **Durante el periodo de exposición gripal:** Tomar un envase unidosis a la semana.
- **Al inicio del estado gripal:** Tomar un envase unidosis lo antes posible en cuanto aparezcan los primeros síntomas. Si es necesario, repetir la toma cada 6 horas, 2 ó 3 veces.
- **En un estado gripal declarado:** Tomar un envase unidosis por la mañana y otro por la noche durante 3 días.

Vaciar directamente el contenido entero de un envase unidosis bajo la lengua manteniéndolo hasta su disolución.

Si los síntomas empeoran o persisten durante más de tres días, debe consultar a un médico. OSCILLOCOCCINUM se absorbe por vía sublingual.

"Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas."
"Recuerde tomar su medicamento."

Si estima que la acción de OSCILLOCOCCINUM es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Si usted ha tomado OSCILLOCOCCINUM más de lo que debe, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico.

Si olvidó tomar OSCILLOCOCCINUM no tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, OSCILLOCOCCINUM puede tener efectos adversos. Si se observa cualquier reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaram.es>. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. CONSERVACIÓN DE OSCILLOCOCCINUM

No se precisan condiciones especiales de conservación. Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase unidosis.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el punto  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Mantenga OSCILLOCOCCINUM fuera del alcance y de la vista de los niños.

PRO.1A77 - 10/13

BOIRON[®]