

# Osteocynesine

COMPRIMIDOS  
MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO

## Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para Vd.

Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe usted utilizar con cuidado OSTEOCYNESINE para obtener los mejores resultados.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten, debe consultar a un médico.

## En este prospecto:

- 1- ¿Qué es OSTEOCYNESINE y para qué se utiliza?
- 2- Antes de tomar OSTEOCYNESINE
- 3- ¿Cómo tomar OSTEOCYNESINE?
- 4- Posibles efectos adversos
- 5- Conservación de OSTEOCYNESINE

## Las sustancias activas son:

Calcarea ostreica..... 3 DH    Calcarea phosphorica ..... 3 DH  
Calcarea fluorica ..... 3 DH    Sulfur iodatum ..... 4 CH  
aa 75 mg

Los demás componentes son: sacarosa (225 mg), lactosa (72 mg), estearato de magnesio, c.s.p. un comprimido de 300 mg.

## Titular de la autorización de comercialización:

BOIRON S.I.H., s.a - Av. Valdelaparra, nº 27 - 28108 Alcobendas - MADRID

## Fabricante:

BOIRON - 2 avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 Messimy - FRANCIA

## 1. ¿QUÉ ES OSTEOCYNESINE Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

OSTEOCYNESINE se presenta en caja de 60 comprimidos. OSTEOCYNESINE es un medicamento homeopático utilizado tradicionalmente para la descalcificación, trastornos del crecimiento en el niño, consolidación de las fracturas y convalecencia.

## 2. ANTES DE TOMAR OSTEOCYNESINE

Si usted está embarazada o en período de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

A la dosis recomendada, OSTEOCYNESINE no ejerce ningún efecto sobre la capacidad de conducir vehículos o manejar maquinaria.

Este medicamento contiene sacarosa y lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

"Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento incluso los adquiridos sin receta médica".

## 3. ¿CÓMO TOMAR OSTEOCYNESINE?

Disolver en la boca 2 comprimidos de 2 a 3 veces al día, distanciándolos de las comidas.

Vía oral.

"Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas"

"Recuerde tomar su medicamento"

Si estima que la acción de OSTEOCYNESINE es demasiado fuerte o débil, comuníquesele a su médico o farmacéutico.

Si los síntomas empeoran o persisten, consulte a su médico.

Si usted ha tomado OSTEOCYNESINE más de lo que debe, consulte inmediatamente a su médico o a su farmacéutico.

Si olvidó tomar OSTEOCYNESINE, no tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

## 4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, OSTEOCYNESINE puede tener efectos adversos.

Si se observa cualquier reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

## Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: [www.notificaram.es](http://www.notificaram.es). Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

## 5. CONSERVACIÓN DE OSTEOCYNESINE

Conservar protegido de la luz y de la humedad.

No utilizar este medicamento después de la fecha de caducidad indicada en la caja.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el punto SIGRE de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Mantenga OSTEOCYNESINE fuera del alcance y de la vista de los niños.

PRO.19XG - 11/13

BOIRON®