STODAL® infantil

JARABE

Medicamento homeopático

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para Vd.
Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe usted utilizar con cuidado Stodal infantil para obtener los mejores resultados.
- *Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.*
- *Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.*
- *Si los síntomas empeoran o persisten después de 5 días, debe consultar con un médico.*

En este prospecto:

1-¿Qué es Stodal infantil y para qué se utiliza?
2- Antes de tomar Stodal infantil
3- ¿Cómo tomar Stodal infantil?
4- Posibles efectos adversos
5- Conservación de Stodal infantil

Stodal infantil se presenta en frasco de 150 ml con vaso dosificador.

Los sustancias activas son:

Drosera	3 CH
Arnica montana	3 CH
Belladonna	3 CH
Cina	3 CH
Coccus cacti	3 CH
Corallium rubrum	3 CH
Cuprum	3 CH
Ferrum phosphoricum	3 CH
Ipeca	3 CH
Solidago virga aurea	1 CH

aa.

Los demás componentes son: jarabe simple, benzoato de sodio (E211), ácido cítrico (E330) y agua purificada.

Titular de la autorización de comercialización:
BOIRON S.I.H. , s.a
Avda. Valdelaparra, 27
28108 Alcobendas, MADRID

Responsable de la fabricación:
BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy, FRANCIA

1. ¿QUÉ ES STODAL INFANTIL Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

Stodal infantil es un jarabe que se presenta en forma de 150ml con vaso dosificador.

Stodal infantil es un medicamento homeopático utilizado tradicionalmente en el tratamiento sintomático de la tos no productiva, seca e irritativa.

2. ANTES DE TOMAR STODAL INFANTIL

Embarazo y lactancia

Si usted está embarazada o en período de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

A la dosis recomendada, Stodal infantil no ejerce ningún efecto sobre la capacidad de conducir vehículos o manejar maquinaria.

Stodal infantil contiene sacarosa. Si su médico le ha dicho que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

Los pacientes con diabetes mellitus deben tener en cuenta que:
- Cada 2,5 ml de Stodal infantil contienen 2,1 g de sacarosa.
- Cada 5 ml de Stodal infantil contienen 4,2 g de sacarosa.
- Cada 15 ml de Stodal infantil contienen 12,6 g de sacarosa.

"Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento incluso los adquiridos sin receta médica"

3. ¿CÓMO TOMAR STODAL INFANTIL?

Utilizar el vaso dosificador para medir la cantidad indicada a continuación:

Niños:

Menores de 5 años: 2,5ml de 3 a 4 veces al día.

A partir de 5 años: 5 ml de 3 a 5 veces al día.

A partir de 18 años: 15ml de 3 a 5 veces al día.

Las tomas deben repartirse a lo largo del día y al acostarse.

Vía oral.

Un jarabe no debe tomarse de forma prolongada.

"Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas. Recuerde tomar su medicamento."

Si estima que la acción de Stodal infantil es demasiado fuerte o débil, comuníqueselo a su médico o farmacéutico.

Stodal infantil no debe utilizarse en casos de tos productiva. En caso de enfermedad bronquial o pulmonar crónica.

Si los síntomas empeoran o persisten pasados 5 días, consulte con su médico.

El tratamiento no debe durar más de 5 días.

Si ha tomado Stodal infantil más de lo que debe, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico.

Si olvidó tomar Stodal infantil no tome una dosis doble para compensar las tomas olvidadas.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, Stodal infantil puede provocar efectos adversos.

Si se observa cualquier reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico ,farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: **www.notificaram.es**. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. CONSERVACIÓN DE STODAL INFANTIL

No se precisan condiciones especiales de conservacion.

No utilizar Stodal infantil después de la fecha de caducidad indicada en la caja.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE de la farmacia.

En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Mantenga Stodal infantil fuera del alcance y de la vista de los niños.

PRO.1DMA – 06/17

BOIRON®