

Cicaderma

POMADA
MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para Vd.

Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe Vd. utilizar con cuidado Cicaderma para obtener los mejores resultados.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeora o persisten pasado una semana, consulte a su médico.

En este prospecto:

- 1- ¿Qué es Cicaderma y para qué se utiliza?
- 2- Antes de usar Cicaderma
- 3- ¿Cómo usar Cicaderma?
- 4- Posibles efectos adversos
- 5- Conservación de Cicaderma

Cicaderma pomada

Las sustancias activas en cada 100 g son:

Calendula officinalis (planta fresca)	20 g
Hypericum perforatum (planta fresca)	10 g
Achillea millefolium (planta fresca)	10 g
Ledum palustre TM	1,5 g
Pulsatilla TM	1,5 g

El otro componente es vaselina.

Titular de la autorización de comercialización:

BOIRON SIH, s.a - Av. Valdelaparra, nº 27 - 28108 Alcobendas - MADRID

Responsable de la fabricación:

BOIRON - 2 avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 Messimy - FRANCIA

1- ¿QUÉ ES CICADERMA Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

Cicaderma se presenta en tubo de pomada de 30 g.

Cicaderma es un medicamento homeopático utilizado tradicionalmente en heridas superficiales, quemaduras leves y picaduras de insectos.

2- ANTES DE USAR CICADERMA

Cicaderma no debe ser utilizada por personas alérgicas a la Calendula, al Hypericum, a la Achillea millefolium o a cualquier otro componente del preparado. No aplicar en lesiones infectadas y supurantes.

Embarazo y lactancia

Si usted está embarazada o en período de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar un medicamento.

Cicaderma contiene Hypericum, por lo que debe evitarse la exposición al sol de las zonas impregnadas con la pomada, por el riesgo de fotosensibilización.

"Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica"

3- ¿CÓMO USAR CICADERMA?

Después de limpiar la zona afectada, aplicar una ligera capa sobre la piel irritada de 1 a 3 veces al día.

Uso cutáneo.

"Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas"

"Recuerde utilizar su medicamento"

Si estima que la acción de Cicaderma es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o a su farmacéutico.

Si los síntomas empeora o persisten pasado una semana, consulte a su médico. El tratamiento no debe durar más de una semana.

Si usted ha utilizado Cicaderma más de lo que debe, consulte inmediatamente a su médico o a su farmacéutico.

Si olvidó utilizar Cicaderma:

No utilice una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, Cicaderma puede tener efectos adversos.

Si se observa cualquier reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o con su farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaram.es>.

Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. CONSERVACIÓN DE CICADERMA

No se precisan condiciones especiales de conservación.

No utilizar Cicaderma después de la fecha de caducidad indicada en la caja.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura.

Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el punto SIGRE  de la farmacia.

En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Mantenga Cicaderma fuera del alcance y de la vista de los niños.

PRO.TDHS-05/17

BOIRON®