

## Prospecto: información para el paciente

Los medicamentos son:

**Mercurius bi-iodatus 3 CH glóbulos BOIRON**  
**Mercurius bi-iodatus 4 CH glóbulos BOIRON**  
**Mercurius bi-iodatus 5 CH glóbulos BOIRON**  
**Mercurius bi-iodatus 6 CH glóbulos BOIRON**  
**Mercurius bi-iodatus 7 CH glóbulos BOIRON**  
**Mercurius bi-iodatus 9 CH glóbulos BOIRON**  
**Mercurius bi-iodatus 12 CH glóbulos BOIRON**  
**Mercurius bi-iodatus 15 CH glóbulos BOIRON**  
**Mercurius bi-iodatus 30 CH glóbulos BOIRON**  
**Mercurius bi-iodatus 100 CH glóbulos BOIRON**  
**Mercurius bi-iodatus 200 CH glóbulos BOIRON**  
**Mercurius bi-iodatus 6 DH glóbulos BOIRON**  
**Mercurius bi-iodatus 8 DH glóbulos BOIRON**  
**Mercurius bi-iodatus 12 DH glóbulos BOIRON**  
**Mercurius bi-iodatus 30 DH glóbulos BOIRON**  
**Mercurius bi-iodatus 200 K glóbulos BOIRON**  
**Mercurius bi-iodatus 1000 K glóbulos BOIRON**  
**Mercurius bi-iodatus 10.000 K glóbulos BOIRON**

Puede que solamente estén comercializadas algunas presentaciones.

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

### Contenido del prospecto

1. Qué es Mercurius bi-iodatus glóbulos y para qué se utiliza.
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Mercurius bi-iodatus glóbulos.
3. Cómo tomar Mercurius bi-iodatus glóbulos.
4. Posibles efectos adversos.
5. Conservación de Mercurius bi-iodatus glóbulos.
6. Contenido del envase e información adicional.

### 1. Qué es Mercurius bi-iodatus glóbulos y para qué se utiliza

Medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas. Autorizado mediante registro simplificado especial, en el que se garantiza su calidad farmacéutica y su inocuidad, sin que sea necesario

presentar datos de eficacia (Directiva 2001/83/CE). Consulte con un profesional sanitario para su utilización y acuda al médico si los síntomas persisten.

## **2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Mercurius bi-iodatus glóbulos**

**No tome Mercurius bi-iodatus glóbulos** si es alérgico al Mercurius bi-iodatus o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

### **Advertencias y precauciones**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Mercurius bi-iodatus glóbulos.

En caso de empeoramiento de los síntomas o si no se produjera mejoría después de 7 días de iniciar el tratamiento, se deberá consultar con el médico o farmacéutico.

### **Otros medicamentos y Mercurius bi-iodatus glóbulos**

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento, incluidos los que no requieren prescripción médica.

### **Toma de Mercurius bi-iodatus glóbulos con alimentos y bebidas**

Tomar Mercurius bi-iodatus glóbulos preferiblemente alejado de las comidas.

### **Embarazo, lactancia y fertilidad**

Si está embarazada, en periodo de lactancia o cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

### **Conducción y uso de máquinas**

No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

**Mercurius bi-iodatus glóbulos contiene lactosa y sacarosa (azúcar). Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento. Puede perjudicar los dientes.**

## **3. Cómo tomar Mercurius bi-iodatus glóbulos**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es de 5 glóbulos 3 veces al día.

Mercurius bi-iodatus glóbulos requiere una posología individualizada. Consultar con su farmacéutico o médico formado en homeopatía.

Vía sublingual.

**En el caso de que se haya tomado más Mercurius bi-iodatus del que debiera o en caso de sobredosis o ingestión accidental consulte a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.**

### **Si olvidó tomar Mercurius bi-iodatus glóbulos**

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

#### 4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Si nota síntomas de alergia (hipersensibilidad), interrumpa la toma de Mercurius bi-iodatus glóbulos.

#### Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano:

<https://www.notificaram.es>. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

#### 5. Conservación de Mercurius bi-iodatus glóbulos

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No requiere condiciones especiales de conservación.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase, después de “EXP”. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

No utilice este medicamento si usted observa signos visibles de deterioro.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los

medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

#### 6. Contenido del envase e información adicional

##### Composición de Mercurius bi-iodatus glóbulos

- El principio activo es Mercurius bi-iodatus. Cada envase de 4 g corresponde a un producto terminado con una sola dilución de Mercurius bi-iodatus glóbulos. 5 glóbulos contienen 0,0025 ml de Mercurius bi-iodatus.
- Los demás componentes (excipientes) son 0,21 g de sacarosa y 0,038 g de lactosa.

##### Aspecto del producto y contenido del envase

Son glóbulos, aproximadamente esféricos y blanquecinos.

Los glóbulos se acondicionan en 1 envase que contiene 4 g de glóbulos o 2 envases de 4 g de glóbulos cada uno.

Envase de polipropileno con tapa y etiqueta que envuelve todo y asegura la inviolabilidad.

##### Titular de la autorización de comercialización:

**BOIRON SOCIEDAD IBÉRICA DE HOMEOPATÍA S.A.**

C/ Lanzarote, 2

28703 San Sebastián de los Reyes - Madrid

##### Responsable de la fabricación:

BOIRON  
2 Avenue de L'Ouest Lyonnais  
Messimy 69510  
Francia

Puede solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al titular de la autorización de comercialización.

**Fecha de la última revisión de este prospecto:** Mayo de 2022

La información detallada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>